

U kan kiezen voor
een **DEFINITIEVE** oplossing:
CHIRURGISCHE CASTRATIE

of een **TIJDELIJKE** oplossing:
CASTRATIE MET EEN IMPLANTAAT

CASTRATIE MET EEN IMPLANTAAT

OM HET EFFECT VAN EEN CASTRATIE TE KENNEN

Wist u dat in 27% van de gevallen honden hun seksueel gedrag behouden na castratie?¹
Castratie met een implantaat biedt u de mogelijkheid om het effect te kennen van een chirurgische castratie en vermijdt het nemen van een directe onomkeerbare beslissing. Zo kan u rustig nadenken over de beslissing om uw hond chirurgisch te laten castreren of om hem op regelmatige basis van een implantaat te voorzien gedurende zijn leven.

Vraag raad aan uw dierenarts, deze zal de geschikte methode van castratie voorstellen aangepast aan uw dier en zijn levenswijze.

CASTRATIE EN VOEDING

Gecastreerde dieren hebben minder behoefte aan energie in hun voeding.

Men moet dus de voeding en de hoeveelheid aanpassen na castratie om overgewicht te vermijden. Er zijn voedingen die speciaal ontwikkeld zijn voor gecastreerde honden.

Uw dierenarts kan u adviseren over welke voeding en welke hoeveelheid het beste is voor uw hond.



© 09/2016 Virbac. All right reserved

¹ Spain V, Scarlett J, Houpt K, Long-term risks and benefits of early-age gonadectomy in dogs. JAVMA, Vol 224, No. 3, February 1, 2004;380-387

Virbac Belgium | Esperantolaan 4 | 3001 Leuven
info@virbac.be | www.virbac.be | Tel.: 016/38.72.60

Virbac

Shaping the future of animal health


Hyperseksualiteit?



Dominantie?



Vluchtgedrag?



Urine markering?



Castratie kan
TIJDELIJK of **DEFINITIEF** zijn...
Aan u de keuze!

Castratie kan problemen oplossen.

Vraag advies aan uw dierenarts

Shaping the future of animal health

Virbac

• WAAROM CASTREREN?

✂ CHIRURGISCHE CASTRATIE

\ CASTRATIE MET EEN IMPLANTAAT

Er zijn verscheidene redenen om een castratie van uw reu te overwegen

- **VERMIJDEN VAN ONGEWENSTE VOORTPLANTING**

In het bijzonder wanneer een reu en een teef samen in huis leven.



- **GEDRAGSPROBLEMEN**

Zoals bijvoorbeeld hyperseksualiteit, vluchtgedrag, frequente urinemarkering,...

- **VOOR MEDISCHE REDENEN**

Terugkerende infecties van de voorhuid van de penis, het voorkomen van ziekten van de prostaat of testikeltumoren op latere leeftijd.



De hond kan CHIRURGISCH gecastreerd worden

- **DEZE METHODE IS DEFINITIEF**

en voortplanting is daarna niet meer mogelijk.

Op de dag van de operatie moet de hond nuchter aangeboden worden: castratie gebeurt namelijk onder algemene anesthesie.

Bij een castratie gaat men de 2 testikels verwijderen. Men maakt hiervoor een snede net achter de penis, de snede wordt daarna gehecht.

De wonde heeft ongeveer 12 dagen nodig om te herstellen.



De hond kan met een IMPLANTAAT gecastreerd worden

- **DEZE METHODE IS TIJDELIJK**

Met een implantaat gaat u hetzelfde effect bij uw hond zien als bij een chirurgische castratie.

Het oplosbare implantaat wordt, net zoals bij een identificatiechip, tussen de schouderbladen van de hond geplaatst. Dit implantaat moet niet verwijderd worden.

Nadat het implantaat toegediend is, komt de actieve stof langzaam en continu vrij. Deze gaat gedurende een lange periode de productie van testosteron en andere sexhormonen onderdrukken.

Gedurende de eerste twee à drie weken gaat de concentratie testosteron stijgen waardoor in zeldzame gevallen problemen gelieerd aan dit hormoon tijdelijk erger kunnen worden. Vervolgens kan u de werking van het implantaat controleren door te kijken naar de testikels, deze gaan namelijk 30% kleiner worden.

Enkele weken na de implantatie wordt de hond steriel.

De werkingsduur houdt verschillende maanden aan en is afhankelijk van het type implantaat.

